A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NEONATAL EM RECÉM-NASCIDOS COM PARALISIA BRAQUIAL OBSTÉTRICA

THE IMPORTANCE OF NEONATAL PHYSIOTHERAPY IN NEWBORN WITH OBSTETRIC BRACHIAL PALSY

Layla Myrian de Souza Melo¹, Anna Lorrany Aurélio Vasconcelos¹, Josyvania Vanessa de Souza Lima Freire¹, Nylene Maria Rodrigues da Silva¹

¹Faculdade de Integração do Sertão – FIS, Serra Talhada-PE, Brasil.

Resumo

Introdução: A Paralisia Braquial Obstétrica (PBO) é determinada através do acometimento de um dos membros superiores do recém-nascido, a partir de uma lesão total ou parcial das raízes nervosas a níveis das vertebra cervicais e torácicas. Há, ainda, uma grande estimativa de que uma das causas precursoras dessa patologia seja a indução ao parto de maneira mal sucedida. O presente estudo tem por finalidade salientar o quanto que a fisioterapia neonatal é imprescindível para o tratamento preventivo e de reabilitação precoce, pois trabalha através de estratégias de intervenções que apresentam ótimos resultados e integração facilitada. **Objetivo:** Avaliar a intervenção precoce da fisioterapia em recém-nascidos que apresentam sinais e sintomas da paralisia braquial obstétrica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura utilizando as bases de dados PubMed, LILACS e MEDLINE, utilizou-se os seguintes descritores: fisioterapia, paralisia do plexo braquial e neonatal. Desta demanda, foram encontrados 69 artigos. Após leitura prévia de títulos e resumos, foram classificados 6 artigos que atendiam ao critério de inclusão, publicados nos idiomas inglês e português nos últimos 5 anos e que expusessem livre acesso do texto completo. Aos critérios de exclusão, as revisões, os duplos resultados e aos que não correspondiam com os objetivos desse estudo. **Resultados:** Aos artigos achados teve-se um total de 69 trabalhos e com base nos critérios de exclusão restaram 8 artigos. **Conclusão:** Dessarte, entende-se que a fisioterapia neonatal tem um destaque essencial para o tratamento e prognóstico dos neonatos que possuem diagnóstico de paralisia braquial obstétrica, uma vez que trabalha-se com estratégias de intervenções precoce evitando assim, sequelas funcionais.

Palavras-chave: Fisioterapia. Neonatal. Paralisia do plexo braquial.

Recebido: 06/05/2023

Aprovado: 09/05/2023